

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トノス
2	成分・分量	本品1g中「局外規」テストステロン 10mg,(日局)アミノ安息香酸エチル 100mg,(日局)プロカイン塩酸塩 5mg,(日局)ジブカイン塩酸塩 10mg,(日局)ジフェンヒドラミン塩酸塩 5mgを含有する。添加物として白色ワセリンを含有する。
3	用法・用量	男子更年期障害には患部又は皮膚柔軟部に毎日一回、約 0.1 瓦(小豆大)ずつよくすりこむように塗擦し、好転したら隔日又は週 2 回にする。男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退等)で直接性器に塗る。
4	効能・効果	男子更年期障害、男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、精力減退、遺精、夢精等)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>(1)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)ご使用前に本剤をチューブから 5mm 程度出し、内股など皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。</p> <p>(3)アンドロゲン依存性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人。(4)女性。(5)小児(15歳未満)。(6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。(7)前立腺検査*の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が 2.0ng/mL以上の人(医師の判断に従うこと)。</p> <p>*本剤の有効成分(テストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。</p> <p>a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師または薬剤師に相談すること。</p> <p>(8)睡眠時無呼吸症候群である人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないこと</p> <p>(1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等)。(2)陰茎部先端(尿道口)。</p> <p>(3)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位</p> <p>3. 本剤をしている間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと</p> <p>4. 使用者以外へ付着させないこと</p> <p>(1)ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗ってください。</p> <p>(2)本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。</p> <p>(3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流してください。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。