

*2020年(令和2年)3月改订(自主改订)
2017年(平成29年)11月改订(自主改订)

女性激素乳膏剂

第②类药品

巴斯多敏® 卵泡激素制剂

使用前请阅读本说明书并妥善保管，以便需要时查阅。

本制剂是以雌二醇(天然型卵泡激素)和炔雌醇(合成卵泡激素)配制而成的医药品。卵泡激素是女性激素的一种，也称为雌激素，主要由卵巢分泌，以所谓的“女性气质”和“阴道润滑”等多种作用而广为人知。

伴随卵巢障碍及老化或心理压力而至的卵巢机能衰退，会使卵泡激素分泌减少，从而引发多种症状。例如，更年期的女性因卵泡激素分泌的急剧减少，会出现烦躁、潮热、发汗、性功能低下等各种症状。这些不明原因临床主诉被称作更年期障碍。同时，因绝经后卵泡激素基本不再分泌，阴部失去滋润而萎缩，产生不适感和痛感以致降低生活品质。

本制剂可经由皮肤缓慢补充卵泡激素，以填补卵泡激素的不足，是易于涂抹的乳膏药剂。

⚠ 使用注意事项

☒ 禁止事项

(不能遵守以下事宜，可能会使目前症状恶化，或易产生副作用)

1. 以下人群请勿使用。
 - * (1) 对本制剂或本制剂成份有过敏症史者
 - (2) 在使用前，先从软管中挤出本制剂约3毫米，然后擦涂于大腿内侧等皮肤纤薄处，翌日出现药疹、发红、瘙痒、肿胀等症状者
 - * (3) 血栓症、子宫内膜异位症、脑中风、心脏病、肾病患者或有既往病史者
 - * (4) 乳房或子宫、卵巢处理患肿瘤者及有可能罹患者〔本制剂的有效成份对乳房和子宫恶性肿瘤患者，可能会加快病情进展〕
 - (5) 家族成员或本人有恶性肿瘤史者
 - * (6) 子宫肌瘤、糖尿病、高血压、癫痫、肝功能障碍患者
 - (7) 生理期、非正常阴道出血、有阴道分泌物(白带)者
 - (8) 孕妇或有可能妊娠的女性、哺乳期妇女
 - (9) 儿童
 - 2. 以下部位请勿使用。
 - (1) 眼睛及眼部周围
 - * (2) 外伤、湿疹、溃烂、炎症及严重化脓的患处
 - * 3. 使用本制剂期间，请勿使用以下任何医药品。
 - 含有相同成份的其他医药品
 - * 4. 使用本制剂期间，请勿摄入以下任何食品。
 - 含圣约翰草(St. John's Wort)的食品、依普黄酮
 - 5. 除使用者外，不要使本制剂黏附于他人。
 - (1) 使用后用肥皂和温水将手充分洗净。
 - (2) 除使用者外，注意不要黏附于他人。如有附着应立即用水冲洗。
 - (3) 涂抹部位可能与他人发生触碰的，应将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。
 - 6. 请勿用于避孕目的。
 - (1) 有避孕愿望者，强烈建议采取适当措施。
 - (2) 使用本制剂可能引起月经周期变化，务须避用奥克二氏避孕法等应用月经周期和基础体温的避孕方法。



征求咨询

1. 下述人群，使用前务必向医师、药剂师或注册经销商咨询。
 - (1) 接受医生治疗者
 - (2) 对药品等有过敏(发疹、发红、发痒、皮疹、肿胀等)史者
2. 使用后，出现以下症状者，可能发生副作用，应立即停止使用并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

相关部位	症 状	相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、肿胀	消化器官	恶心、呕吐、食欲不振
乳房	疼痛、胀满	其他	头痛、浮肿、眩晕

- * 3. 生理周期及经血状态明显反常者，应立即停止使用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。
- 4. 使用两周左右而症状无改善者，应持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。
- * 5. 使用方法失当时，应立即停止使用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

* 其他注意事项

初次使用本制剂前，建议作乳房和子宫的医学检查。使用开始后，请作乳房和子宫的定期检查。

请续读背面。

■ 功能 功效 ■

妇女更年期障碍、卵泡激素不足引发的机能障碍、女性生殖器发育不全、闭经、痛经、经期异常、卵巢功能失调、功能性子宫出血、缺乳、不孕症、性唤起障碍、手足厥冷。

【用语解说】妇女更年期障碍：因年龄增长或心理压力，引起卵巢机能衰退，使女性激素分泌减少，从而发生各种各样的自律神经失调症状（潮红、潮热、发冷、烦躁等）

■ 用法 用量 ■


以适当药量涂抹局部

【关于用法用量的注意事项】

- (1) 务必严守规定的用法和用量。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，务须接受眼科医生诊疗。
- (3) 使用前后，请将手指清洗干净。
- (4) 将涂抹部位清洁后使用。
- (5) 仅限于外用。

■ 详细用法 ■

- 一日一次（洗浴后就寝前）或二次（早、晚），从软管中取本制剂1厘米左右于手指上（参照右图），广泛均匀涂抹于手臂、腿部、腰部等部位。
- 月经结束后，使用两周。之后，应待下次月经结束前停用。
- 已绝经者或因月经不调而长期停经者（妊娠中不可使用）可即刻使用。使用两周后，应停用两周以上。
- 症状发生于泌尿器官、生殖器官的，请直接涂抹于外阴部。
- 已改善的症状复发时，可按同样的方法再次使用。



■ 成份 含量 ■

100克当中含有以下有效成份

有效成份	100克当中	内容
炔雌醇	0.02克	合成卵胞激素
雌二醇	0.06克	卵胞激素


添加物中含有白凡士林、硬脂醇、单硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯氢化蓖麻油60、丙二醇、羟苯甲酯、羟苯丙酯。

■ 保存及操作注意事项 ■

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 请勿换装于其他容器（易引发误用或变质）。
4. 请勿使用过期制品。
- * 5. 请勿将附着本制剂的手触摸眼睛及粘膜。
6. 过量挤出的本制剂，不要重新收回至软管。

■ 其 他 ■

本制剂因记载法定说明所需，使用大于内容量的容器。因而，容器内留有间隙。为维护品质封装氮气充填并对内容量严格管理。



制药销售单位



大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里 624 番地 2 (ALIA207)