


大東製薬工業・お勧め製品セルフチェック（男性向け）



タイプ	トノス	ガラナポーン ガラナピン	グローミン	ヘヤーグロン	詳細のご案内
A	◎	◎	◎	○	男性ホルモンの分泌低下による性機能の衰えが考えられますので、まずは毎日、「グローミン」(または「ヘヤーグロン」か「トノス」)を陰嚢部に塗布して男性ホルモンの補充をお試し下さい。対症的には、性交前に「ガラナポーン(ガラナピン)」を服用して心因性EDに対応し、「トノス」を亀頭冠に塗布することで射精潜時の遅延をめざします。
B	×	◎	◎	○	男性ホルモンの分泌低下による勃起力の衰えが考えられますので、まずは毎日、「グローミン」(または「ヘヤーグロン」)を陰嚢部か腹部に塗布して男性ホルモンの補充をお試し下さい。対症的には、性交前に「ガラナポーン(ガラナピン)」の服用して心因性EDに対応します。
C	◎	×	◎	○	男性ホルモンの分泌低下による射精機能の低下が考えられますので、「グローミン」(または「ヘヤーグロン」か「トノス」)を陰嚢部に塗布して男性ホルモンの補充をしたうえで、性交前に「トノス」を亀頭冠に塗布して射精潜時の遅延に対応します。
D	◎	×	×	×	性交前に「トノス」を亀頭冠へ塗布して、射精潜時の遅延に対応します。ホルモン補充(陰嚢部への塗布)は不要です。
E	×	◎	×	×	特に心因性EDや腔内射精障害であれば、「ガラナポーン(ガラナピン)」の服用で効果が期待できます。ホルモン補充は不要です。なお、重症の自覚がありましたら、性機能外来のある泌尿器科を受診して専門医にご相談下さい。
F	×	×	◎	○	男性ホルモンの分泌低下が考えられますので、毎日、「グローミン」(または「ヘヤーグロン」)を陰嚢部か腹部に塗布して男性ホルモンの補充をお試し下さい。1ヶ月経過して全く改善しない場合は、本剤を1週間以上中止してから男性更年期やLOH症候群に対応できる医療機関(泌尿器科・心療内科)を受診して下さい。
G	×	×	×	×	ED、早漏、腔内射精障害以外の性機能障害につきましては、泌尿器科を受診して性機能の専門医にご相談下さい。男性更年期には未だ早い年齢で、強いストレスを感じて「うつ」状態である場合は、心療内科や精神科の受診を強くお勧めします。