

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ヘヤーグロン
2	成分・分量 (本品 1g 中)	テストステロン 10mg を含有する。添加物として、白色ワセリン、サラシミツロウ、ステアリルアルコール、セタノール、コレステロールを含有する。
3	用法・用量	適当量を局所に塗擦する。 【詳しい使用方法】 男性:1日2回(朝・晩)7mmを陰のう部、腹部やあご下によくすり込むように塗る。 女性:1日1回2mmを患部に塗布する。また、陰粘膜への塗布は避けること。
4	効能・効果	男性ホルモン分泌不足による性器の神経衰弱の諸症即ち勃起力減退、早漏、陰萎、性欲欠乏、性感減退、遺精、辜丸欠落症、先天性辜丸發育不全、脳下垂体性腺ホルモンが無効の潜伏辜丸、女性恥部無毛症、乳汁の分泌抑制。
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ご使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。 前立腺腫瘍又は乳腫瘍(悪性)及びその疑いのある人。 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。 前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人(最終的な判断は主治医に従うこと)。 睡眠時無呼吸症候群である人。 妊婦又は妊娠している可能性のある女性、授乳婦。 次の部位には使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等)。 陰茎部先端(尿道口)。 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある患部。 本剤を使用している間は、抗凝血薬(ワルファリンカリウム等)を使用しないこと 使用者以外への付着させないこと <ol style="list-style-type: none"> ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗ってください。 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流してください。 内服用に使用しないこと 本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないこと
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。